

GUÍA DE BOLSILLO^{1,2,3}



FLEXIMAX - ACE

FLEXIMAX - NAP

Indicación: Relajante muscular



Origen del espasmo:

- Postural
- Mecánico



Origen del espasmo:

- Traumático



Posible efecto analgésico



Potencial efecto analgésico y antiinflamatorio



Alternativa en pacientes con lesiones gastrointestinales




Combinación segura en pacientes con antecedentes cardiovasculares



Posología: 1 tableta cada 12 horas por 7 días



No produce somnolencia, rápido reintegro a las actividades diaria



MATERIAL PARA EL CUERPO MÉDICO

Referencia: Marcianò, G.; Vocca, C.; Evangelista, M.; Et al. The Pharmacological Treatment of Chronic Pain: From Guidelines to Daily Clinical Practice. *Pharmaceutics* 2023, 15, 1165. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041165>

Referencia cuadro adaptado:

1. KetenciA, OzcanE, Karamursels. Assessmentofefficacyand psychomotorperformances ofthiocolchicosideand tizanidinein patientswithacute lowback pain. *IntJ Clin Pract.* 2005;59(7):764-770. doi:10.1111/j.1742-1241.2004.00454.
2. Tüzün F, Unalan H, Oner N, et al. Multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial ofthiocolchicoside in acute low back pain. *Joint Bone Spine.* 2003;70(5):356-361. doi:10.1016/s1297-319x(03)00075-7
3. Brutzkus JC, Shahrokhi M, Varacallo M. Naproxen. In: *StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 4, 2023*

FLEXIMAXNAP®: Contenido: Cada tableta recubierta contiene: Naproxeno Sódico equivalente a 250 mg de Naproxeno y Tiocolchicosido 4 mg. Excipientes c.s.p. Indicaciones: ANALGÉSICO / RELAJANTE MUSCULAR. DOSIS: Según prescripción médica. Vía de administración: po - Oral. Contraindicaciones: hipersensibilidad a los principios activos o a sus excipientes. broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico. reacciones alérgicas conocidas al ácido acetil salicílico o a cualquiera de los aines. úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedentes de enfermedad ácido-péptica. disfunción hepática o renal (depuración de creatinina <30 ml/min). embarazo y lactancia. no debe emplearse en menores de 18 años. pacientes con miastenia gravis, parálisis flácida o hipotonía muscular. precauciones y advertencias: puede producir reacciones de fotosensibilidad por lo tanto no es recomendable la exposición solar mientras se ingiere el medicamento. reducir la dosis en caso de diarrea. el uso concomitante con el ácido acetil salicílico (asa) incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. riesgo de problemas de fertilidad en el desarrollo fetal y cáncer. VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. Almacenar a no más de 30° C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Registro Sanitario. INVIMA 2019M-0015541-R1. Fabricado por: LAFRANCOL S.A.S., Cali - Colombia.

FLEXIMAXACE®: CONTENIDO: Cada tableta recubierta contiene: 325 mg de Acetaminofén y Tiocolchicosido 4 mg. Excipientes c.s.p. Forma farmacéutica: TN - tabletas con o sin recubrir. que no modifiquen liberación fármaco. DOSIS: Según prescripción médica. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Po - Oral. Almacenar a no más de 30° C. Indicaciones: analgésico/ relajante muscular. Contraindicaciones: contraindicaciones y advertencias: hipersensibilidad a los principios activos o a sus excipientes. disfunción hepática o renal (depuración de creatinina menor a 30 ml/min). alcoholismo activo hepatitis viral o enfermedad hepática activa. embarazo y lactancia. no debe emplearse en menores de 18 años. puede producir reacciones de fotosensibilidad por lo tanto no es recomendable la exposición solar mientras se ingiere el medicamento. reducir la dosis en caso de diarrea. puede incrementar la toxicidad del cloranfenicol. Venta bajo fórmula médica. Manténgase fuera del alcance de los niños. Registro Sanitario: INVIMA 2015M-0016335. Fabricado por: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL.