

CUESTIONARIO DE FUNCIÓN ERÉCTIL.

SI SOSPECHA QUE SU PACIENTE PRESENTA DISFUNCIÓN ERÉCTIL REALICE ESTE TEST.

EL ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL, TAMBIÉN LLAMADO TEST IIEF-5, PERMITE EVALUAR LA DE A PARTIR DE 5 PREGUNTAS PRECISAS. ESTE CUESTIONARIO SE ENCUENTRA VALIDADO EN ESPAÑOL PARA SU IMPLEMENTACIÓN DE MANERA FÁCIL.

PREGUNTA 1. DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA LOGRÓ UNA ERECCIÓN DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES?

- 1. CASI NUNCA O NUNCA
- 2. MENOS DE LA MITAD DE LAS VECES
- 3. LA MITAD DE LAS VECES
- 4. MÁS DE LA MITAD DE LAS VECES
- 5. CASI SIEMPRE O SIEMPRE

PREGUNTA 2. CUANDO TUVO RELACIONES CON ESTIMULACIÓN SEXUAL ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA RIGIDEZ DEL PENE FUE SUFICIENTE PARA LA PENETRACIÓN?

- 1. CASI NUNCA O NUNCA
 - 2. MENOS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 3. LA MITAD DE LAS VECES
 - 4. MÁS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 5. CASI SIEMPRE O SIEMPRE
- NO HUBO ESTIMULACIÓN SEXUAL

PREGUNTA 3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LOGRÓ MANTENER LA ERECCIÓN DESPUÉS DE LA PENETRACIÓN?

- 1. CASI NUNCA O NUNCA
 - 2. MENOS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 3. LA MITAD DE LAS VECES
 - 4. MÁS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 5. CASI SIEMPRE O SIEMPRE
- NO HE TENIDO RELACIONES SEXUALES

PREGUNTA 4. ¿CUÁL FUE EL GRADO DE DIFICULTAD PARA MANTENER LA ERECCIÓN HASTA COMPLETAR LA RELACIÓN SEXUAL?

- 1. EXTREMADAMENTE DIFÍCIL
 - 2. MUY DIFÍCIL
 - 3. DIFÍCIL
 - 4. UN POCO DIFÍCIL
 - 5. NO FUE DIFÍCIL
- NO HE TENIDO RELACIONES SEXUALES

PREGUNTA 5. LAS RELACIONES SEXUALES QUE HA TENIDO DURANTE ESTE TIEMPO ¿RESULTARON SATISFACTORIAS PARA USTED?

- 1. CASI NUNCA O NUNCA
 - 2. MENOS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 3. LA MITAD DE LAS VECES
 - 4. MÁS DE LA MITAD DE LAS VECES
 - 5. CASI SIEMPRE O SIEMPRE
- NO HE TENIDO RELACIONES SEXUALES

RESULTADOS DEL TEST

- DISFUNCIÓN ERÉCTIL GRAVE: DE 5 A 10 PUNTOS
- DISFUNCIÓN ERÉCTIL MEDIA: DE 11 A 15 PUNTOS
- DISFUNCIÓN ERÉCTIL LIGERA: DE 16 A 20 PUNTOS
- FUNCIÓN ERÉCTIL NORMAL: DE 21 A 25 PUNTOS.

REF:CEBALLOS MP, ÁLVAREZ VILLARRAGA J, SILVA JM, URIBE, JF, MANTILLA D. GUÍA DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL. SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGÍA. 2015; 24 (3): 185.E1-185.E22. DOI: 10.1016/J.UROCO.2015.04.006
DE*: DISFUNCIÓN ERÉCTIL

DURAX 5MG
INDICACIONES: DISFUNCIÓN ERÉCTIL. HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (BPH). 3.-DISFUNCIÓN ERÉCTIL E HIPERPLASIA BENIGNA ESTA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE (DE) Y LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (DE/BPH)
CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO. PACIENTES EN TRATAMIENTO CON NITRATOS ORGÁNICOS, NITROGLICERINA O COMPUESTOS DONANTES DE ÓXIDO NÍTRICO. PACIENTES CON PREDISPOSICIÓN DE RETINOPATÍA PIGMENTOSA. PACIENTES CON NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR NO ARTERÍAL. PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIO-VASCULARES EN QUIENES LA ACTIVIDAD SEXUAL NO ESTÁ ACONSEJADA POR REPRESENTAR UN RIESGO POTENCIAL, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN, ANTECEDENTE RECIENTE DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, ANGINA INESTABLE O ANGINA ESTABLE SECUNDARIA A ACTIVIDAD SEXUAL, INSUFICIENCIA CARDIACA IGUAL O MAYOR AL GRADO 2, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), ARRITMIAS NO CONTROLADAS, HIPOTENSIÓN O HIPERTENSIÓN ARTERIALES NO CONTROLADAS. DURAX VSD NO SE DEBE USAR EN PACIENTES CON ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES DE RECIENTE APARICIÓN. EL USO DE DURAX VSD NO ESTÁ INDICADO EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA, RENAL O CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: · ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL CON DURAX VSD, ES NECESARIO REALIZAR UNA HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO COMPLETOS, CON EL FIN DE CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO Y DETERMINAR LA CAUSA SUBYACENTE. · SE RECOMIENDA INICIAR EL TRATAMIENTO CON DURAX VSD CON LA DOSIS MÁS BAJA EFECTIVA Y DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN MÉDICA. EL AJUSTE DE LA DOSIS DEPENDERÁ DE LA RESPUESTA CLÍNICA REFERIDA POR EL USUARIO Y EL SEGUIMIENTO MÉDICO POSTERIOR. · DURAX VSD NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL Y/O LA FRECUENCIA CARDIACA DE ADULTOS SANOS. SIN EMBARGO, ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL, SE DEBE EVALUAR EL ESTADO CARDIOVASCULAR DEL PACIENTE, DEBIDO A QUE EXISTE UN GRADO DE RIESGO CARDÍACO ASOCIADO CON LA ACTIVIDAD SEXUAL. DURAX VSD TIENE PROPIEDADES VASODILATADORAS, LO CUAL PUEDE PRODUCIR UNA DISMINUCIÓN LIGERA Y TRANSITORIA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA Y PUEDE POTENCIAR EL EFECTO HIPOTENSOR DE LOS NITRATOS O DE LOS MEDICAMENTOS ALFA-1-BLOQUEADORES. · LOS CONSUMOS DE ALCOHOL EN CANTIDADES MAYORES A 0.5 GRAMOS/KILOGRAMO DE PESO, CONCOMITANTES A LA INGESTA DE DURAX VSD, PUEDEN PRODUCIR UNA DISMINUCIÓN DE LAS CIFRAS DE TENSIÓN ARTERIAL. SE RECOMIENDA EL CONSUMO MÍNIMO DE ALCOHOL, CUANDO EL PACIENTE ESTÉ EN TRATAMIENTO CON DURAX VSD. · LOS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ÁCIDO-PÉPTICA O ÚLCERA GASTRODUDENAL, REQUIEREN DE SEGUIMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO CON DURAX VSD. ANTE LA EXACERBACIÓN DE SÍNTOMAS ASOCIADOS A ESTA CONDICIÓN, SE DEBE SUSPENDER EL MEDICAMENTO. · DURAX VSD NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL SISTEMA DE COAGULACIÓN. LOS PACIENTES QUE TIENEN TRASTORNOS CONTROLADOS DE LA COAGULACIÓN, PUEDEN RECIBIR TRATAMIENTO CON DURAX VSD, SIEMPRE Y CUANDO LOS BENEFICIOS SUPEREN LOS RIESGOS Y BAJO EL ESTRICTO CRITERIO MÉDICO. ESTE TIPO DE PERSONAS REQUIEREN DE UN MONITOREO CLÍNICO ESTRECHO. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN MANIFESTACIONES ASOCIADAS A SANGRADO O DISFUNCIÓN HEMATOLOGÍA, SE DEBE SUSPENDER INMEDIATAMENTE EL TRATAMIENTO. · LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA O RENAL, CLASIFICADAS COMO LEVES, PUEDEN RECIBIR TRATAMIENTO CON DURAX VSD, SIEMPRE Y CUANDO LOS BENEFICIOS SUPEREN LOS RIESGOS Y BAJO EL ESTRICTO CRITERIO MÉDICO. NO SE RECOMIENDA EL USO DE DURAX VSD EN PACIENTES CON VALORES DE DEPURACIÓN DE CREATININA MENORES A 30 ML/MIN O EN AQUELLOS POR CUYA FUNCIÓN HEPÁTICA, SE HALLEN CLASIFICADOS COMO CHILD-PUGH GRADO C. · DURAX VSD SE DEBE ADMINISTRAR CON PRECAUCIÓN EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS; SE RECOMIENDA LA EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PREVIA Y NO EXCEDER DE UNA TABLETA EN EL DÍA. · RIESGO POTENCIAL DE PÉRDIDA SÚBITA DE LA AUDICIÓN. · RIESGO POTENCIAL DE GENERAR DISMINUCIÓN O PÉRDIDA REPENTINA DE LA VISIÓN. · LOS PACIENTES CON DEFORMIDADES ANATÓMICAS DEL PENE O ENFERMEDAD DE PEYRONIE, DEBEN TENER UNA VALORACIÓN MÉDICA PREVIA AL INICIO DEL TRATAMIENTO CON DURAX VSD. ESTOS PACIENTES TIENEN UN RIESGO MAYOR DE PRIAPISMO SECUNDARIO AL USO DE INHIBIDORES DE PDE-5. ESTOS PACIENTES PUEDEN RECIBIR TRATAMIENTO CON DURAX VSD, SI EL CRITERIO MÉDICO APOYA EL BENEFICIO DEL MEDICAMENTO. LOS PACIENTES CON ANEMIA, MIELOMA MÚLTIPLE O LEUCEMIA, TIENEN UN MAYOR RIESGO DE PRESENTAR UN PRIAPISMO SECUNDARIO AL USO DE INHIBIDORES DE PDE-5. EN ESTOS PACIENTES SE RECOMIENDA EL TRATAMIENTO CON LA MENOR DOSIS EFECTIVA DE DURAX VSD.

DURAX 10 MG DURAX 20 MG
INDICACIONES: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL.
CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO. PACIENTES EN TRATAMIENTO CON NITRATOS ORGÁNICOS, NITROGLICERINA O COMPUESTOS DONANTES DE ÓXIDO NÍTRICO. PACIENTES CON PREDISPOSICIÓN DE RETINOPATÍA PIGMENTOSA. PACIENTES CON NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR NO ARTERÍAL. PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIO-VASCULARES EN QUIENES LA ACTIVIDAD SEXUAL NO ESTÁ ACONSEJADA POR REPRESENTAR UN RIESGO POTENCIAL, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN, ANTECEDENTE RECIENTE DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, ANGINA INESTABLE O ANGINA ESTABLE SECUNDARIA A ACTIVIDAD SEXUAL, INSUFICIENCIA CARDIACA IGUAL O MAYOR AL GRADO 2, DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), ARRITMIAS NO CONTROLADAS, HIPOTENSIÓN O HIPERTENSIÓN ARTERIALES NO CONTROLADAS. NO SE DEBE USAR EN PACIENTES CON ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES DE RECIENTE APARICIÓN. EL USO NO ESTÁ INDICADO EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA, RENAL O CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN. RIESGO POTENCIAL SOBRE PÉRDIDA SÚBITA DE LA AUDICIÓN Y RIESGO POTENCIAL DE GENERAR DISMINUCIÓN O PÉRDIDA REPENTINA DE LA VISIÓN. REGISTROS SANITARIOS: DURAX VSD 5MG INVIMA 2015M0015784. DURAX VSD 10MG INVIMA 2015M0015786. DURAX VSD 20MG INVIMA 2015M0015785. VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. ELABORADO POR LAFRANCOL S.A.S., CALI COLOMBIA. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA.

REGISTROS SANITARIOS: DURAX VSD 5MG INVIMA 2015M0015784. DURAX VSD 10MG INVIMA 2015M0015786. DURAX VSD 20MG INVIMA 2015M0015785. VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. ELABORADO POR LAFRANCOL S.A.S., CALI COLOMBIA.
MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO