

DUSPATALIN®
(MEBEVERINA CLORHIDRATO)
UNA SOLUCIÓN A LOS
SÍNTOMAS DEL SÍNDROME
INTESTINO IRRITABLE (SII)



LAS DIRECTRICES ACTUALES RECOMIENDAN LOS ANTIESPASMÓDICOS
COMO FÁRMACOS DE ELECCIÓN EN PACIENTES CON **SII** EN LOS QUE
PREDOMINA **EL DOLOR ABDOMINAL** ENTRE LOS SÍNTOMAS COMUNES.¹

¿QUÉ DICEN LAS GUÍAS INTERNACIONALES SOBRE EL TRATAMIENTO DEL SII?

En la última revisión, realizada en el 2016, la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus siglas en inglés) abordó temas respecto al tratamiento y a nuevas opciones terapéuticas para el síndrome de intestino irritable (SII). De acuerdo con la guía, el uso de los antiespasmódicos de mayor disponibilidad en cada región continúa teniendo un papel importante como primera línea de tratamiento para los dolores ocasionados por el síndrome.² Asimismo, guías como la de la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA, por sus siglas en inglés), recomienda el uso de antiespasmódicos para una mejoría significativa en los síntomas del SII.²

MEBEVERINA VS. OTROS ANTIESPÁSMODICOS

La mebeverina es un agente antiespasmódico que trata los síntomas del SII originados por espasmos del músculo liso intestinal. Actúa directamente sobre la musculatura intestinal y regula la función del intestino. Se ha demostrado que la mebeverina es una opción terapéutica eficaz y segura en pacientes con SII.¹



Diversos estudios evaluaron la eficacia de la mebeverina y la hioscina frente a placebo, se destacaron beneficios significativos de ambos fármacos en la mejora de síntomas del SII como: dolor y distensión abdominal, estreñimiento y diarrea¹⁻³



En cuanto al perfil de seguridad, los pacientes tratados con hioscina reportaron algunos efectos secundarios como sequedad en la boca, visión borrosa, taquicardia y/o alucinaciones. Mientras que, con la mebeverina no se reportaron efectos adversos clínicamente relevantes.³



Otro antiespasmódico de estudio fue la trimebutina, la cual presentó una mejoría inconstante del dolor abdominal; no obstante, no se demostró una diferencia significativa frente a placebo. Los efectos secundarios más experimentados fueron náuseas, temblor de manos y malestar estomacal.³



DUSPATALIN® (MEBEVERINA CLORHIDRATO) ES UN
TRATAMIENTO EFICAZ PARA LOS PACIENTES CON SII
QUE PRESENTAN SÍNTOMAS DE DOLOR Y DISTENSIÓN
ABDOMINAL, ESTREÑIMIENTO Y DIARREA.¹