

**Clinacyn**<sup>Gel</sup>  
0,1% / 1% Adapaleno Clindamicina

**EFICACIA Y  
TOLERABILIDAD**

  
**Abbott**



## CONTENIDO


- Acné, características, tratamiento actual del acné vulgar de leve a moderado, análisis de eficacia y tolerabilidad.
- Estudio comparativo.
- Eficacia y tolerabilidad de adapaleno al 0,1 % con clindamicina al 1 % frente a adapaleno al 0,1 % con peróxido de benzoilo al 2,5 % en el acné vulgar.

# ACNÉ, CARACTERÍSTICAS, TRATAMIENTO ACTUAL DEL ACNÉ VULGAR DE LEVE A MODERADO, ANÁLISIS DE EFICACIA Y TOLERABILIDAD.




## ACNÉ ENFERMEDAD INFLAMATORIA<sup>1</sup>

- Comedones
- Pápulas
- Nódulos
- Quistes<sup>1</sup>



## AFECTA<sup>1</sup>:



**85%** de las personas entre 12 y 24 años


**56%** niños

**45%** en niñas entre 14 a 16 años<sup>1</sup>

## ACNÉ VULGAR<sup>1</sup>

Afecta principalmente la cara

- Imagen negativa de si mismo
- Baja auto estima
- Depresión
- Fobia social
- Ansiedad<sup>1</sup>



## TRATAMIENTOS TÓPICOS DIRIGIDOS A DIFERENTES PATÓGENOS



### ADAPALENO + CLINDAMICINA

#### Reducción en<sup>1</sup>:

- Comedones
- Lesiones inflamatorias
- Terapia con antibióticos
- Potencial de resistencia bacteriana.<sup>1</sup>



## ESTUDIO COMPARATIVO

TRATAMIENTO ACTUAL DEL ACNÉ → TERAPIA COMBINADA

Los retinoides tópicos en combinación con clindamicina o Peróxido de Benzoilo son la terapia combinada de primera línea.<sup>1</sup>

Evidencia 2023 Tratamiento Acné vulgar comparando eficacia y tolerabilidad.<sup>1</sup>



## COMBINACIONES TÓPICAS

Adapaleno al **0,1 %**


+

Clindamicina al **1 %**

Adapaleno al **0,1 %**

+

Peróxido de benzoilo (BPO) al **2,5 %**



## MÉTODO<sup>1</sup>:

- **Duración** : 1 año
- **Perfil del paciente**: 14 a 30 años con acné vulgar de leve a moderado
- **Grupos** : asignación aleatoria de pacientes<sup>1</sup>



## EL PODER ANTIINFLAMATORIO



### RESULTADOS<sup>1</sup>:

- **EFICACIA:**

Reducciones medias en el número de lesiones no inflamatorias

**(11,16 ± 8,01 y 11,12 ± 8,62 respectivamente)**

Pápulas inflamatorias

**(49,78 ± 37,57 y 50,48 ± 36,57 respectivamente)<sup>1</sup>**

Después de 12 semanas de tratamiento, ambos grupos tuvieron reducciones medias similares en lesiones no inflamatorias, pápulas inflamatorias y pústulas en comparación con el inicio.

**Eficacias similares en el tratamiento del acné.**

- **TOLERABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS:**

La incidencia de sensación de ardor fue significativamente mayor en el grupo de adapaleno-BPO que en el grupo de adapaleno-clindamicina

**(32 % frente a 6 %; P = 0,002).<sup>1</sup>**

**El adapaleno con clindamicina fue mejor tolerado que el adapaleno con BPO.<sup>1</sup>**

## CONCLUSIONES

- 1.** Tanto el adapaleno tópico con clindamicina como el adapaleno con BPO son tratamientos combinados igualmente efectivos para el acné vulgar de leve a moderado.
- 2.** La combinación adapaleno-clindamicina logró una mejor respuesta al tratamiento en pacientes con acné inflamatorio con pústulas.
- 3.** El adapaleno-clindamicina también tuvo un mejor perfil de tolerabilidad que el adapaleno-BPO, lo que provocó una menor incidencia de irritación de la piel y sensación de ardor.<sup>1</sup>

**Clinacyn**<sup>Gel</sup>  
0,1%/ 1% Adapaleno Clindamicina

## EL PODER ANTIINFLAMATORIO

### EN ACNÉ LEVE COMEDONIANO E INFLAMATORIO<sup>2</sup>

---

#### POSOLOGÍA<sup>3</sup>

Aplicar una capa delgada sobre las áreas afectadas, con la piel limpia, 1 vez/día, antes de acostarse.<sup>3</sup>

---

#### MICRONIZACIÓN<sup>4,5</sup>

- + Permite una absorción más eficiente
- + Mayor tolerancia y adherencia
- Menor irritación
- = Eficacia clínica comprobada<sup>4,5</sup>

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020M-0015746-R1

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tóxico de acné vulgaris.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Adapaleno micronizado 0.1% /clindamicina fosf eqv clindamicina 1.0 g contraindicado en individuos con historia de hipersensibilidad a preparaciones que contengan clindamicina, adapaleno o alguno de los componentes de la preparación, historia de enteritis regional o colitis ulcerativa o historia de colitis asociado a antibióticos. embarazo, lactancia, menores de doce (12) años.

PRECAUCIONES:

solo para uso externo. signos y síntomas cutáneos con eritema, sequedad, rasquiña, quemazón o prurito se pueden experimentar durante el tratamiento. evitar el contacto con los ojos, labios, ángulos de la nariz y membranas mucosas. evitar la exposición excesiva a la luz solar, inclusive lámparas solares. el uso concomitante con productos tóxicos pueden causar sequedad o irritación de la piel, así como jabones o limpiadores medicados o abreviados, jabones y cosméticos con fuerte efecto de secado y productos con altas concentraciones de alcohol, astringente, donde pueda ocurrir irritación local. en caso de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes discontinuar la terapia. no aplicar en heridas, eczemas, quemaduras solares o piel erosionada. evitar la exposición a la luz u.v. acta 01/2008, numeral 2.1.2.5.

Referencias :

1-Dharshini AP, Manickam N, Gopalan K. -E cacy and Tolerability of 0.1 % Adapalene With 1% Clindamycin Versus 0.1% Adapalene With 2.5% Benzoyl Peroxide on Acne

Vulgaris: A Case Control Study. International Journal of Dermatology and Venereology. 2023; 6(1): 20-24. Doi: 10.1097/JD9.0000000000000279

2-Rusu A, Tanase C, Pascu GA, Todoran N. Recent advances regarding the therapeutic potential of adapalene. Pharmaceuticals. 2020;13(9):1–22.

3-CLINACYN GEL (Antiacneico tóxico) - Laboratorio ABBOTT [Internet].

4-Amr S, Brown MB, Martin GP, Forbes B. Activation of clindamycin phosphate by human skin. J Appl Microbiol. 2001;90(4):550–4.

5-Patel RR, Karelia BN. A study of effectiveness and safety of topical combination therapy for acne vulgaris patients in dermatology department of a tertiary care teaching hospital. Int J Basic Clin Pharmacol. 2020;9(3):458.