



SMECTA® Nro Registro: INVIMA 2019M-011939-R2 Forma Farmacéutica POLVOS – **INDICACIONES:** ANTIDIARREICO – **CONTRAINDICACIONES:** HIPERSENSIBILIDAD AL MEDICAMENTO, INSUFICIENCIA RENAL. EL MEDICAMENTO DEBE SER COADYUVANTE EN EL MANEJO DE LAS DIARREAS Y EN NINGUN CASO REEMPLAZA O SUSTITUYE LA PRIMERA ELECCIÓN QUE CORRESPONDE A LAS SALES DE REHIDRATACIÓN. SI LOS TRASTORNOS NO DESAPARECEN AL CABO DE 7 DIAS O SE ASOCIAN A FIEBRE O VOMITOS, CONVIENE CONSULTAR CON EL MEDICO NUEVAS ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES - SIEMPRE DEBE CONSIDERARSE LA HIDRATACIÓN EN PACIENTES DÉBILES Y EN LACTANTES Y NIÑOS UTILIZANDO SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (SRO), O REHIDRATACIÓN INTRAVENOSA TENIENDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA DIARREA, LA EDAD Y EL CONTEXTO CLÍNICO DEL PACIENTE. - SE DEBE TENER CUIDADO AL UTILIZAR DIOSMECTITA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES MÉDICOS DE ESTREÑIMIENTO CRÓNICO GRAVE. - ESTE MEDICAMENTO CONTIENE GLUCOSA Y SACAROSA. NO SE RECOMIENDA EN PACIENTES QUE PRESENTEN ENFERMEDADES HEREDITARIAS RARAS COMO INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA, SÍNDROME DE MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA O DEFICIENCIA DE SACARASA-ISOMALTASA. - ESTE MEDICAMENTO CONTIENE PEQUEÑAS CANTIDADES DE ETANOL (ALCOHOL), MENOS DE 100 MG POR DOSIS DIARIA. - -SMECTA® NO ESTÁ RECOMENDADO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA. SI ESTÁ EMBARAZADA O EN PERIODO DE LACTANCIA, CREE QUE PODRÍA ESTAR EMBARAZADA O TIENE INTENCIÓN DE QUEDAR EMBARAZADA, CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.

ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C EN LUGAR FRESCO Y SECO.

MATERIAL DIRIGIDO AL CUERPO MÉDICO