

CINEMATECA

FRIDA KAHLO

ÍCONO DE IDENTIDAD FEMENINA



UN VIAJE POR LA VIDA DE LA ICÓNICA ARTISTA FRIDA KAHLO, CONTADA A TRAVÉS DE SUS PROPIAS PALABRAS EXTRAÍDAS DE DIARIOS, CARTAS, ENSAYOS Y ENTREVISTAS. ANIMACIONES LÍRICAS INSPIRADAS EN SUS OBRAS.

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el dolor y la adversidad.

A los seis años, contrajo poliomielitis, lo que dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda. Pero esto solo fue el comienzo de sus desafíos. A los 18 años, un trágico accidente de autobús la dejó con múltiples fracturas y la obligó a someterse a más de treinta operaciones a lo largo de su vida.

Durante su prolongada recuperación, Frida encontró consuelo en la pintura. Con un espejo sobre su cama, comenzó a crear autorretratos que no solo reflejaban su dolor físico, sino también su lucha interna y su resistencia frente a las normas de género de su época. En 1929, se casó con el famoso muralista Diego Rivera, una relación tumultuosa que influyó profundamente en su obra.



Drospirenona 3mg/ Etinilestradiol 0,02 mg manejo del síndrome disfórico premenstrual



Los resultados de los estudios, que han evaluado los efectos de drospirenona 3 mg/ etinilestradiol 0,02 mg en un régimen 24/ 4 sobre los síntomas emocionales y físicos del síndrome disfórico premenstrual, muestran una importante disminución de las puntuaciones totales de dicho síntomas, en comparación con placebo, además de una notable superioridad en todos los ítems del deterioro funcional.^{1,2}



En uno de los estudios, el tamaño del efecto, basado en la diferencia respecto al valor basal, fue de 1,2. Esto se considera un gran efecto, teniendo en cuenta que los tamaños del efecto de los estudios sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual oscilan entre 0,13 y 1,2. ²



Además, el esquema 24/4 proporciona una mayor supresión del desarrollo folicular y un nivel más estable de hormonas exógenas a lo largo del ciclo, lo que contribuye a un mejor alivio de los síntomas.¹



Yax[®]
3 mg Drospirenona / 0,03 mg Etinilestradiol

ANTICONCEPTIVO ORAL
CON EFECTO
ANTIMINERALOCORTICOIDE

Yaxibelle[®]
3 mg Drospirenona / 0,02 mg Etinilestradiol

ANTICONCEPTIVO ORAL
PARA EL MANEJO DEL
SÍNDROME DISFÓRICO
PREMENSTRUAL



IDENTIDAD FEMENINA

Yax. RS INVIMA: INVIMA 2020M-0004318-R2. Composición: Drospirenona 3,0 mg / Etinilestradiol 0,03mg. Presentación: Caja x 21 tabletas. Indicación: Anticoncepción oral. Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad al medicamento, embarazo y lactancia, trombosis, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, enfermedad hepática, cáncer de mama o genital. Venta bajo fórmula médica. Lafranco S.A.S. Cali, Colombia
Yaxibelle. RS INVIMA: INVIMA 2021M-0007655-R1. Composición: Drospirenona 3,0mg / Etinilestradiol 0,02mg. Presentación: 24 tabletas recubiertas con principio activo y 4 placebo. Indicación: Anticonceptivo oral, tratamiento del síndrome disfórico premenstrual. Tratamiento del acné vulgar moderado. Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad al medicamento, embarazo y lactancia, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, enfermedad hepática. Cáncer de mama o genital. Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C y en el envase y empaque original. Venta bajo fórmula. Elaborado y distribuido por Lafranco S.A.S. Cali, Colombia.

REFERENCIAS

- Bachmann, G., & Kopacz, S. (2009). Drospirenone/ethinyl estradiol 3 mg/20 µg (24/4 day regimen): Hormonal contraceptive choices—Use of a fourth-generation progestin. *Patient Preference and Adherence*, 3, 259-264. doi:10.2147/PPA.S3901.
- Rapkin, A. J., & McDonald, M. (2007). Ethinyl estradiol/drospirenone for the treatment of the emotional and physical symptoms of premenstrual dysphoric disorder. *Women's Health (London, England)*, 3(4), 395-408