


GUÍA DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE UROMAX®

(UNDECANOATO DE TESTOSTERONA)



ESTA GUÍA PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE UROMAX® CON EL FIN DE AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS EVENTOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE O DESPUÉS DE LA INYECCIÓN.

- Compruebe las contraindicaciones y advertencias especiales según la información para prescripción del producto antes de administrar la inyección.
- No usar Uromax® después de la fecha de caducidad indicada en los empaques.
- Consérvese a temperatura no mayor a 30 C°.

VIAL DE UROMAX®

1. Use una jeringa de 5 ml
2. Extraiga la solución colocando la aguja en el punto más bajo del vial, utilizando una aguja de 18 G (1,2 mm) x 50 mm
3. Utilice una jeringa de 5 ml y extraiga 4 ml de la solución de Uromax® del vial de vidrio.
4. Seleccione el tamaño de aguja adecuado de acuerdo con la grasa del paciente y la masa muscular de la región glútea.
5. Los expertos recomiendan el uso de una aguja de 20G (0,9 mm), 21G2,3 (0,8 mm) o 22G (0,7 mm) para garantizar una inyección intramuscular lenta y la deposición del contenido

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Acueste al paciente en una posición cómoda
- La inyección intramuscular profunda debe administrarse con el paciente acostado
- La cama debe estar completamente plana y las manos del paciente deben mantenerse debajo de la cabeza
- Recordarle al paciente que permanezca quieto durante la inyección



COLOCACIÓN DE LA INYECCIÓN

- El sitio preferido para la inyección intramuscular es el músculo glúteo medio ubicado en la parte superior
- Se debe tener cuidado para evitar que la aguja golpee la arteria glútea superior y el nervio ciático.
- Uromax® debe inyectarse estrictamente por vía intramuscular y muy lentamente (idealmente 2 minutos)¹



PASO A PASO

- Después de seleccionar el lugar de inyección, limpie el área con un antiséptico
- Si hay poca masa muscular, es posible que deba pellizcar de 2 a 3 bordes del músculo glúteo para proporcionar más volumen y tejido para insertar la aguja
- Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 90° para asegurarse de que esté profundamente incrustada en el músculo
- Sujete firmemente el cilindro de la jeringa con una mano. Con la otra mano, tire del émbolo hacia atrás para aspirar la sangre
- Si aparece sangre, no proceda con la inyección. Retire la aguja del paciente inmediatamente y reemplácela
- Repita cuidadosamente los pasos para la inyección
- Si no se aspira sangre, mantenga la posición de la aguja para evitar cualquier movimiento
- Aplique la inyección muy lentamente presionando el émbolo con cuidado y a una velocidad constante hasta que se administre todo el medicamento.
- Retire la aguja

EL PACIENTE DEBE SER OBSERVADO DURANTE E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA INYECCIÓN DE UROMAX® PARA PERMITIR EL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LOS POSIBLES SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN INDICAR MICROEMBOLIA PULMONAR OLEOSA (POME).¹

MICROEMBOLIA PULMONAR OLEOSA (POME)

- La POME es una reacción basada en inyección y está fisiopatológicamente relacionada con el síndrome de embolia grasa. Puede ocurrir después de la administración vascular o linfovascular directa de preparaciones a base de aceite, que luego llegan al pulmón desde la circulación venosa y el gasto cardíaco derecho.
- En raras ocasiones, la microembolia pulmonar puede provocar signos y síntomas como: tos (o ganas de toser), disnea, malestar general, hiperhidrosis, dolor torácico, mareos, parestesia o síncope.¹
- Estas reacciones pueden ocurrir durante o inmediatamente después de la inyección y son reversibles. El tratamiento suele ser de apoyo, por ejemplo, mediante la administración de oxígeno suplementario.¹
- A veces, estos síntomas pueden ser difíciles de distinguir de una reacción alérgica que puede ocurrir con el uso de cualquier producto inyectable.



CUALQUIER REPORTE O EVENTO ADVERSO PUEDE HACERLO A ABBOTT EPD COLOMBIA AL E-MAIL: pv.colombia@abbott.com